



Dr Ali Beddouche

Chirurgien urologue · Andrologie · Sexologie

TÉMARA · MAROC

INFORMATION PATIENT · FICHE COMPLÉMENTAIRE · C008 · FR

Synéchie des petites lèvres

01 Comprendre

Chez la petite fille, les petites lèvres peuvent se coller partiellement. Ce phénomène est généralement bénin et lié à la fragilité locale, sans signifier une malformation grave. Parfois l'urine reste piégée puis coule après la miction.

02 Comment faire le bilan ?

Un examen doux suffit souvent. Il précise la gêne urinaire, les irritations et d'éventuelles infections. Un examen invasif n'est pas systématique.

03 Que peut-on faire ?

En l'absence de gêne, surveillance et soins doux peuvent suffire. Une crème prescrite pendant une durée limitée est parfois utile. Une séparation est réservée à des indications précises : ne jamais forcer à domicile.

PRÉCAUTIONS ET SIGNES D'ALERTE

Impossibilité d'uriner, fièvre ou douleur importante : consultez rapidement. Les récidives sont possibles et ne prouvent pas un défaut d'hygiène.

QUESTIONS À POSER

Demandez : faut-il traiter maintenant ? Comment appliquer la crème et éviter l'irritation ?

RÉFÉRENCES · CONSULTÉES LE 04/10/2026

NHS · Synéchie des petites lèvres



التصاق الشفرين الصغيرين عند الطفلة

01 لنفهم الحالة

قد يلتصق الشفران الصغيران جزئياً عند الطفلة. يكون الأمر غالباً حميداً ويرتبط بحساسية الجلد المحلية، ولا يعني تشوهاً خطيراً. وقد يُحتجز البول ثم يتسرب بعد التبول.

02 كيف نقيّم الحالة؟

يكفي غالباً فحص لطيف يقيّم التبول والتهيج والعدوى المحتملة. لا يلزم فحص تدخلي بصورة منهجية.

03 ما الذي يمكن فعله؟

عند غياب الانزعاج قد تكفي المراقبة والعناية اللطيفة. تُوصف أحياناً كريمات لفترة محدودة. يُحجز الفصل لتوصيات محددة؛ لا تحاولوا الفصل بالقوة في المنزل.

الاحتياطات وعلامات الإنذار

تعذر التبول أو الحمى أو الألم المهم يستدعي استشارة سريعة. قد يتكرر الالتصاق دون أن يدل على سوء النظافة.

أسئلة للاستشارة

اسألوا: هل يلزم العلاج الآن؟ وكيف يُستعمل الكريم ويُتجنب التهيج؟