



Dr Ali Beddouche

Chirurgien urologue · Andrologie · Sexologie

TÉMARA · MAROC

INFORMATION PATIENT · FICHE COMPLÉMENTAIRE · C021 · FR

Cicatrices post-circuncision

01 Comprendre

Une cicatrice après circoncision évolue pendant plusieurs mois. Un aspect irrégulier ou une sensibilité temporaire n'exige pas toujours une nouvelle opération. Douleur persistante, adhérence ou peau qui tire peuvent toutefois gêner.

02 Comment faire le bilan ?

L'examen distingue cicatrisation normale, inflammation, adhérence et problème de quantité de peau. Le résultat dépend du geste initial et des tissus, pas d'une photographie seule.

03 Que peut-on faire ?

Les soins suivent les consignes de l'opérateur. Ne grattez pas, ne coupez pas une adhérence et n'appliquez pas de mélange corrosif. Une correction se discute après évaluation, généralement lorsque la cicatrice est stabilisée.

PRÉCAUTIONS ET SIGNES D'ALERTE

Après chirurgie, saignement persistant, plaie qui s'ouvre, pus, fièvre ou difficulté à uriner nécessitent un avis rapide.

QUESTIONS À POSER

Demandez : est-ce encore une phase de cicatrisation ? Quelle correction est utile et quels risques comporte-t-elle ?

RÉFÉRENCES · CONSULTÉES LE 04/10/2026

BAUS · Informations sur les interventions



ندبات بعد الختان

01 لنفهم الحالة

تتغير ندبة الختان خلال عدة أشهر. عدم انتظام المظهر أو الحساسية المؤقتة لا يفرضان عملية أخرى دائمًا. لكن الألم المستمر أو الالتصاق أو شد الجلد قد يسبب انزعاجًا.

02 كيف نقيّم الحالة؟

يُميّز الفحص بين الالتئام الطبيعي والالتهاب والالتصاق ومشكلة كمية الجلد. لا تكفي صورة للحكم على النتيجة.

03 ما الذي يمكن فعله؟

تُتبع تعليمات الجراح. لا تحكوا الندبة ولا تقطعوا التصاقًا ولا تطبقوا خلطات كاوية. تُناقش الجراحة التصحيحية بعد تقييم، وغالبًا بعد استقرار الندبة.

الاحتياطات وعلامات الإنذار

النزف المستمر أو انفتاح الجرح أو القيح أو الحمى أو صعوبة التبول بعد التدخل يستدعي رأيًا سريعًا.

أسئلة للاستشارة

اسألوا: هل ما زالت مرحلة التئام؟ وما التصحيح المفيد وما مخاطره؟