



Dr Ali Beddouche

Chirurgien urologue · Andrologie · Sexologie

TÉMARA · MAROC

INFORMATION PATIENT · FICHE COMPLÉMENTAIRE · C025 · FR

Alprostadil intra-urétral

01 Comprendre

L'alprostadil peut être administré dans l'urètre pour faciliter l'érection chez certains hommes. Ce traitement est différent d'une injection dans les corps caverneux et ne remplace pas l'excitation sexuelle ni le bilan des causes.

02 Comment faire le bilan ?

Le médecin vérifie les traitements, l'état de l'urètre, le risque de priapisme et la tolérance. La première utilisation et le dosage sont organisés selon le produit et la situation.

03 Que peut-on faire ?

Utilisez seulement la présentation prescrite et la méthode apprise. Brûlure locale, gêne chez la partenaire, vertige ou baisse de tension sont possibles. Signalez une partenaire enceinte ; une protection peut être nécessaire. La disponibilité varie selon le pays.

PRÉCAUTIONS ET SIGNES D'ALERTE

Une érection persistant 4 heures nécessite les urgences. Malaise important ou réaction allergique : soins immédiats. Ne cumulez pas les traitements de l'érection sans consigne.

QUESTIONS À POSER

Demandez : comment utiliser ce produit, à quelle fréquence et que faire si la réponse est insuffisante ?

RÉFÉRENCES · CONSULTÉES LE 04/10/2026

EAU · Dysfonction érectile



الألبروستاديل داخل الإحليل

01 لنفهم الحالة

قد يُعطى الألبروستاديل داخل الإحليل لتسهيل الانتصاب لدى بعض الرجال. يختلف عن الحقن داخل الجسمين الكهفيين، ولا يعوض التقييم الطبي والإثارة الجنسية.

02 كيف نقيّم الحالة؟

يراجع الطبيب الأدوية وحالة الإحليل وخطر الانتصاب المطول والتحمل. تُنظم أول تجربة والجرعة حسب المستحضر والحالة.

03 ما الذي يمكن فعله؟

استعملوا الشكل الموصوف والطريقة التي تعلمتموها فقط. قد يحدث حرقان أو انزعاج للشريكة أو دوار أو انخفاض الضغط. اذكروا حمل الشريكة؛ فقد تلزم حماية. يختلف توفر الدواء حسب البلد.

الاحتياطات وعلامات الإنذار

انتصاب يستمر 4 ساعات يستدعي الطوارئ. الإغماء المهم أو التحسس الشديد يحتاج رعاية فورية. لا تجمعوا علاجات الانتصاب دون تعليمات.

أسئلة للاستشارة

اسألوا: كيف أستعمله وبأي وتيرة؟ وماذا أفعل عند استجابة غير كافية؟